

ANEXO A

CIRURGIA REPARADORA DE LIFTING DE COXAS



Orientações prévias:

- **leia** atentamente todo o conteúdo deste documento;
- **informe** todas as suas dúvidas ao médico;
- **assine** o termo somente após ter todas as dúvidas sanadas.

Material de apoio: SBCP – Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica a respeito deste procedimento:

www2.cirurgioplastica.org.br/cirurgias-e-procedimentos/contorno-corporal/lifting-de-coxa

1.

A cirurgia de lifting de coxas é um procedimento tipicamente reparador, uma vez que tem como objetivo remodelar as coxas, reduzindo o excesso de pele e a gordura, resultando em uma pele mais lisa e contornos mais proporcionais das coxas e dos membros inferiores.

acordo do paciente

2. A CIRURGIA DE LIFTING DE COXAS ME FOI DETALHADAMENTE EXPLICADA PELA EQUIPE MÉDICA, POR ISSO ENTENDO QUE:

2.1



esse procedimento é reparador e não estético ou de embelezamento;

2.2



o lifting de coxas não tem o propósito exclusivo de remoção do excesso de gordura;

2.3



o médico possui um limite de segurança para a retirada de pele e gordura, a fim de evitar possíveis problemas à saúde do paciente, e este limite nem sempre será compatível com os desejos do paciente;

2.4



a assimetria corporal pode ser causada por assimetria já existente ou diferença biológica da cicatrização entre os dois lados do corpo decorrente às características do próprio organismo;

2.5



a drenagem linfática é um procedimento complementar à cirurgia plástica e que o resultado final da cirurgia depende da realização de todas as sessões indicadas pelo profissional qualificado. Portanto, declaro que a drenagem é de minha responsabilidade, que irei proceder com todas as sessões de drenagem linfática indicadas pelo médico, bem como a escolha do profissional devidamente qualificado.

acordo do paciente

3. DECLARO AINDA:

3.1

não estar em período gestacional ou de lactação, tampouco qualquer desconfiança de gravidez. Foi-me amplamente alertado que não é indicada a realização do procedimento durante a gravidez e/ou durante a amamentação;

3.2

que fui informado(a) sobre eventual necessidade de prorrogação do tempo de internação hospitalar, inclusive, com necessidade de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para garantir uma melhor recuperação no pós-operatório e/ou tratar possíveis intercorrências ocorridas durante ou após o ato cirúrgico. Estou ciente ainda, que os custos decorrentes da internação hospitalar ficarão sob minha responsabilidade. Em havendo a utilização de Plano de Saúde para cobertura dos custos, estou ciente que possíveis questionamentos deverão ser acordados com a instituição hospitalar e o plano de saúde.

acordo do paciente



O paciente submetido à cirurgia de lifting de coxas, precisa de cuidados especiais, conforme indicados detalhadamente no ANEXO B.

acordo do paciente



SOBRE A PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS:

Eu autorizo que a equipe médica utilize os meus registros (vídeos, som e imagem) para executar os procedimentos propostos, para fins de complementação documental do meu prontuário médico e discussão do caso clínico com outros colegas médicos. Fica explícito ainda, que o compartilhamento de imagens, tratamento de dados e outros, se dará somente entre a equipe multidisciplinar e médico assistente deste procedimento.

Durante a consulta e atendimento pela recepção houve a coleta de dados pessoais (CPF, Nome, Telefone, E-mail, Endereço e Informações sobre saúde e hábitos) para questões fiscais e a condução médica adequada. Os dados serão armazenados e preservados por período indeterminado e compartilhados com terceiros, somente quando indispensável para a continuidade ou adequação do tratamento.

Os pacientes, a qualquer momento, poderão: (i) ter acesso às informações cadastradas, (ii) solicitar a atualização ou correção dos seus dados; (iii) solicitar a eliminação de dados que não impactem o histórico de atendimento médico bem como, a total ou parcial, revogação deste consentimento, **mediante termo de solicitação**, nos termos da Lei.

acordo do paciente

Declaro que li a integralidade do conteúdo deste termo, concomitante à explicação verbal da equipe médica e que tive a oportunidade de sanar toda e qualquer dúvida relativa ao procedimento ao qual, voluntariamente, irei me submeter. Assim, dou o meu consentimento à equipe médica para realizar os procedimentos necessários me comprometendo a seguir todas as orientações médicas.

Importante: em caso de dúvidas, esclarecimentos, desconfortos, ou efeitos não esperados recomenda-se o contato imediato com a equipe médica.

_____, ____ de _____ de _____

Paciente:
CPF:

Acompanhante:
CPF:

Dr.
CRM/

**RECOMENDAÇÕES PRÉ-OPERATÓRIAS**

1. — jejum de 8 (oito) horas (não devem ser consumidos líquidos e sólidos, inclusive água);
2. — levar ao hospital todos os exames do pré-operatório;
3. — levar ao hospital modelador e meias antitrombóticas, conforme modelo indicado pelo médico;
4. — comparecer ao hospital 2 (duas) horas antes da cirurgia, com acompanhante, ambos devidamente munidos de seus documentos de identificação;
5. — evitar o uso de aspirina ou qualquer outro medicamento que interfira na coagulação sanguínea, por período de 10 (dez) dias de antecedência à cirurgia;
6. — evitar o uso de todo e qualquer medicamento para emagrecimento, incluindo diuréticos, por período de 15 (quinze) dias de antecedência à cirurgia;
7. — comunicar até 2 (dois) dias antes da cirurgia ocorrências como gripe, indisposição, febre;
8. — evitar o consumo de bebidas alcoólicas e/ou refeições fartas na véspera da cirurgia;
9. — programar suas atividades sociais, domésticas ou escolares, de modo não se tornar indispensável a terceiros por um período aproximado de 2 (duas) semanas.

acordo do paciente**MEDICAÇÃO PRÉ-OPERATÓRIA**

1. — Bromazepam (6mg), meio comprimido via oral antes de dormir e meio comprimido 2 (duas) horas antes da cirurgia.

acordo do paciente**ORIENTAÇÕES E CUIDADOS NO PÓS-OPERATÓRIO**

1. — não se expor ao sol pelo período de 60 (sessenta) dias;
2. — evitar o consumo de bebidas alcoólicas e/ou refeições fartas pós cirurgia;
3. — manter dieta leve e rica em fibras e líquidos;
4. — deverá dormir de barriga para cima por, pelo menos, 60 (sessenta) dias;
5. — cuidar ao se levantar, tossir, espirrar, gargalhar, para não fazer muita contração abdominal para que não haja rompimento dos pontos;
6. — manter modelador pelo período de 60 (sessenta) dias e as meias antitrombóticas pelo período de 07 (sete) dias;

7. — repouso com pequenas caminhadas, sem esforço, a cada três horas para ativar a circulação sanguínea e evitar o risco de trombose;
8. — evitar esforço físico (movimentos bruscos e levantar peso) pelo período de 30 (trinta) dias;
9. — não dirigir pelo período de 15 (quinze) dias;
10. — não realizar atividade física pelo período de 30 (trinta) dias contados da cirurgia ou conforme orientação médica;
11. — não realizar relações sexuais sem moderações pelo período de 14 (quatorze) a 21 (vinte e um) dias;
12. — retornar ao consultório para primeira consulta pós-operatória em dia e horário acordados com a equipe médica;
13. — agendar consulta para retirada de pontos de 7 (sete) até 21 (vinte e um) dias, contados da cirurgia;
14. — agendar sessões de drenagem linfática após a cirurgia, por no mínimo 10 (dez) sessões;
15. — o acompanhamento pós-operatório deverá ser diário até o período de 07 (sete) dias. Caso seja necessário, a consulta poderá ser antecipada a fim de prevenir ou precocemente identificar intercorrências que possam interferir no resultado da cirurgia. Poderão ser utilizados recursos de tele-medicina a fim de garantir o acompanhamento, caso um atendimento presencial não seja possível.

acordo do paciente



MEDICAÇÃO PÓS-OPERATÓRIA

1. — seguir as recomendações médicas e manter o curativo limpo e seco;
2. — Cetoprofeno 100mg, 1 (um) comprimido via oral de 12 (doze) em 12 (doze) horas, pelo período de 5(cinco) dias;
3. — Dipirona 500mg, 1 (um) comprimido via oral de 6 (seis) em 6 (seis) horas, pelo período de 5 (cinco) dias;
4. — Tylex 30mg, 1 (um) comprimido via oral de 8 (oito) em 8 (oito) horas, SE DOR FORTE;
5. — Cefadroxila 500mg, 1 (um) comprimido via oral de 12 (doze) em 12 (doze) horas, pelo período de 7 (sete) dias;
6. — Pantoprazol, 20mg, 1 (um) comprimido via oral pela manhã, em jejum, antes do café, pelo período de 7 (sete) dias;
7. — Dramin B6, 1 (um) comprimido via oral de 8 (oito) em 8 (oito) horas, SE NÁUSEAS E/OU VÔMITOS.

Data:

Paciente:
CPF:

Acompanhante:
CPF:

Dr.
CRM/